



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



EXAMEN DE MICROBIOLOGIE 4^{ème} ANNEE DE MEDECINE
ANNEE 1999/2000 - 1^{ère} PERIODE

Cocher ☐ juste ou fausse

1/ Les bactéries fréquemment responsables de méningites chez le nouveau-né sont :

- a/ E. coli
- b/ Streptococcus agalactiae
- c/ Listeria monocytogenes
- ☒ d/ Toutes ces bactéries
- e/ Aucune de ces bactéries

2/ Les méningites tuberculeuses sont caractérisées par leur :

- a/ Réaction cellulaire habituellement lymphocytaire
- b/ Richesse en Bacilles Acido Alcools Résistants (BAAR) à l'examen direct
- c/ Glycorachie normale ou élevée
- d/ Réaction cellulaire habituellement panachée
- e/ Chloroachie habituellement basse

3/ Dans la famille des enterobacteriaceae, les principaux genres incriminés dans les affections entériques sont :

- ☒ a) Escherichia, Salmonella, Shigella
- b) Proteus, Serratia, Yersinia
- c) Staphylocoques, Campylobacter, Providencia
- d) Erwinia, Levinses, Enterobacter
- e) Proteus, Enterobacter

4/ L'infection intrahospitalière est favorisée par :

- a) Le terrain
- b) les techniques d'investigation
- c) Certains traitements
- ☒ d) a + b
- e) a + b + c

5/ Les méningites récidivantes à la suite d'un traumatisme crânien sont généralement dues à :

- a/ Hemophilus influenzae
- ☒ b/ Streptococcus pneumoniae
- c/ E. coli
- d/ Pseudomonas aeruginosa
- e/ Klebsiella pneumoniae

6/ Chez les malades hospitalisés ou extra hospitalisés, les espèces bactériennes suivantes peuvent être à l'origine d'une suppuration :

- a/ Mycobacterium tuberculosis
- b/ Staphylococcus aureus
- ☒ c/ Pseudomonas aeruginosa
- d/ Klebsiella pneumoniae
- e/ a + b + c + d

7/ La flore cutanée peut être remplacée par des espèces bactériennes de surinfection lors :

- a/ d'une infection superficielle
- b/ d'une infection profonde (abcès formé)
- c/ d'un état d'immunodépression
- d/ d'une utilisation abusive d'antibiotiques
- ☒ e/ d'une utilisation abusive d'antiseptiques

8/ Une variation mineure de l'hémagglutinine du virus grippal se traduit par :

- a) Apparition d'un nouveau sous type
- b) Survenue d'une pandémie
- c) Survenue d'une épidémie
- d) Apparition d'un nouveau variant
- ☒ e) c + d

9/ Le Bactéroides fragilis est une bactérie qui :

- a) Peut être responsable de septicémie et de suppuration
- b) Est Gram négatif, responsable parfois d'abcès de cerveau
- c) Est un bacille anaérobie responsable d'abcès sous-phrénique
- ☒ d) Présente une résistance naturelle à la pénicilline
- e) Toutes ces propositions sont justes.

5/ Les bactéries fréquemment responsables de méningites chez le nouveau né sont :

- a/ E. coli
- b/ Streptococcus agalactiae
- c/ Listeria monocytogenes
- d/ Toutes ces bactéries
- e/ Aucune de ces bactéries.

6/ Chlamydia trachomatis

- a/ Est une bactérie à parasitisme intracellulaire
- b/ Est un virus ayant la particularité d'avoir ADN et ARN
- c/ Est responsable d'infections génitales
- d) a + b
- e) a + c

7/ Le Bactéroïdes fragilis est une bactérie qui :

- a) Peut être responsable de septicémie et de suppuration
- b) Est Gram négatif, responsable parfois d'abcès de cerveau
- c) Est un bacille anaérobie responsable d'abcès sous phrénique
- d) Présente une résistance naturelle à la pénicilline
- e) Toutes ces propositions sont justes.

8/ L'urétrite gonococcique :

- a) N'évolue jamais vers des complications
- b) Peut exister avec une autre maladie sexuellement transmissible
- c) Peut être due à d'autre cocci à Gram négatif
- d) Doit être traitée par la cefixime
- e) Ne nécessite aucun traitement antibiotique

9/ La transmission intra utérine du Cytomegalovirus (CMV)

- a) Elle est la plus fréquente lors de la réactivation
- b) Elle est la plus fréquente lors de la primo-infection
- c) Le nouveau né peut être symptomatique
- d) Le nouveau né peut être asymptomatique
- e) La présence ou l'absence d'anticorps anti-CMV renseignent sur le pronostic fœtal.

10/ Un diagnostic viral rapide peut être demandé par les virus suivants :

- a) Myxovirus influenza
- b) Virus respiratoire syncytial
- c) Para influenza 1-2-3
- d) Adenovirus
- ☒ e) Rhinovirus

11/ Une variation mineure de l'hémagglutinine du virus grippal se traduit par :

- a) Apparition d'un nouveau sous type
- b) Survenue d'une épidémie
- c) Survenue d'une pandémie
- d) Apparition d'un nouveau variant

☒ e) b + d

12/ L'agent HIV est caractérisé par :

- a/ Son extrême variabilité génétique
- b/ Sa possession d'une transcriptase inverse
- c/ Sa large diffusion dans le monde
- d/ Sa transmission par voie sexuelle et sanguine
- ☒ e) Sa résistance à la chaleur et à l'eau de javel